

წინილის მოვლა გაყარის პირობაში

გთავაზობთ რჩევებს ჯანმრთელი წინილის გამოსაზრდელად: მოვამზადოთ სადგომი და გამოვყოთ 182 ფართი, 16 ფრთა ფრინველის გამოსაზრდელად. გამოვყოთ ერთი სტანდარტული საკვებური და საწყურებელი 50 ფრთაზე. დახურულ ოთახში, იატაკზე იყრება ნახურხი 10 სანტიმეტრზე. რაც შეეხება ტემპერატურულ რეჟიმს, პირველი ხუთი დღის განმავლობაში აუცილებელია 30-32°C სითბოს შენარჩუნება, ხოლო, ხუთი დღის შემდეგ, ყოველ მესამე დღეს 1°C ვაკლებთ ტემპერატურას, 65% ტენიანობის უზრუნველყოფით.

ფრინველის გამოსაკვებად გამოიყენება მარცვლეული კულტურები, ძირითადად სიმინდი, რომელსაც პრემიქსი ერევა. პრემიქსის შერევის პროცენტი განისაზღვრება ტომარაზე აღნიშნული შჯალით.

პროფილაქტიკური ღონისძიებები. პირველი ხუთი დღე წინილს ეძლევა ანტიბიოტიკი ალისერული. გართულებული მდგომარეობის შემთხვევაში ანტიბიოტიკი ფლორვილი. ხუთი დღის შემდეგ ვიტამინი განასუპერვიტი ხუთი დღის განმავლობაში. მეცხრე დღეს წინილი იცრება ჭირზე, პრეპარატი ტასოგით. ორი კვირის შემდეგ, ჯი ხდება ფრინველის პროფილაქტიკური დამუშავება კოქციდიოზის საწინააღმდეგო ბიოკოქსით, მეთვრამეტე დღეს ვიყენებთ ვიტამინ-განა ამინოვიტს რათა მოხდეს ბუმბულის სწრაფი ცვლა. მასალა მომზადებულია შიდა ქართლის ვეტერინართა რეგიონული ასოციაციის წევრის, ბატონ მამუკა ქოჩლადის, მიერ.



კითხვები ვაჭარინარს

ბოსოვთ ბზიანობით მოღვაწე ნაწარმის ღირებულების შესახებ



პირუტყვის ნოდულური (კვანძოვანი) დერმატიტი ვირუსული დაავადებაა და მწერების ჯებნის შედეგად ვრცელდება. დაავადების ძირითადი გამოვლინება ჯანის საფარველის ქვეშ კვანძების წარმოქმნაა. დერმატიტი გავრცელებულია აფრიკის, აზიისა და აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში. დაავადებული ცხოველიდან, სისხლისმწოველი მწერებით გადაეცემა ჯანმრთელს, იშვიათია პირდაპირი კონტაქტით ცხოველის დაავადება. ძირითადად ავადდებიან ახალგაზრდა ცხოველები. დაავადებას თან სდევს ცხელება, ცხოველის მოღუნება და უმადობა. შესაძლებელია ცალკეულ შემთხვევაში გვხვდებოდეს გამონადენი თვალისა და ცხვირის არიდან, ნონაში უეცარი ჯღება და პროდუქტიულობის ვარდნა. მაგრამ, დაავადების ძირითადი ნიშნები ჯანის ქვეშ მრავლობით კვანძების წარმოქმნაა. კვანძები ვითარდება როგორც ჯანქვეშ ასევე შინაგან ორგანოებსა და სისტემებზე. შესაძლებელია მეორადი ინფექციის განვითარებაც, დაჩირქება, ანთებითი პროცესი და სხვა. დაავადება არ გადაეცემა ადამიანს. დაავადების ნიშნების

შენიშვნისთანავე მიმართეთ ვეტერინარს.

მომზადებულია სამცხე-ჯავახეთის ვეტერინართა რეგიონული ასოციაციის წევრის ცირა ინსარაძის მიერ

საქართველოში ნაწარმების ვაჭარინართა რეგიონული ასოციაციები

მოგზაურობის ასოციაციის მართვის მართვის მართვა

მის: საქართველო, თბილისი, იეთიმ გურჯის 7ბ
ტელ.: (+995) 32 245 75 45

აჭარა

მის: ქ. ბათუმი, ტ. აბუსერიძის 29ა.
თავმჯდომარე - ნანა ბალანჩივაძე
ტელ.: 599 57 08 75

იბრაჰიმი

მის: ქ. ქუთაისი, გოგებაშვილის ქ. 16/18/20
თავმჯდომარე - ზვიად ნატრიაშვილი, ტელ.: 599 71 20 17

სამცხე-ჯავახეთის რეგიონული ასოციაცია

მის: შოთა მესხიას სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სენაკის ფილიალი.
თავმჯდომარე - ბესო გოგოლი
ტელ.: 599 501 807

კახეთი

მის: კაჭრეთის საზოგადოებრივი კოლეჯი "ასი" გურჯაანი
თავმჯდომარე - აკაკი ელანიძე
ტელ.: 593 609 638

სამცხე-ჯავახეთი

მის: სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, ახალციხე
თავმჯდომარე - შოთა ყულჯანიშვილი
ტელ.: 551 972 900

შიდა ქართლი

მის: სოფელ ფხვენისის სოციო ეკონომიკური ზონა, გორი
თავმჯდომარე - არსენ ნოზაძე
ტელ.: 593 735694